

CALENDRIER DE VACCINATION | Enfants jusqu'à six ans



ÂGE	VACCIN
DÈS LA NAISSANCE	BCG ¹
	HÉPATITE B ²
2 MOIS	IPV ³
	PENTAVALENT (DTC+Hib+HB)
	ROTAVIRUS ⁴
	PNEUMOCOCCIQUE 20 VALENT
3 MOIS	MÉNINGOCOCCIQUE C
4 MOIS	IPV ³
	PENTAVALENT (DTC+Hib+HB)
	ROTAVIRUS ⁵
	PNEUMOCOCCIQUE 10 VALENT
5 MOIS	MÉNINGOCOCCIQUE C
6 MOIS	IPV ³
	ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (ROR) DOSE ZÉRO
	PENTAVALENT (DTC+Hib+HB)
	COVID-19
7 MOIS	COVID-19
9 MOIS	FIÈVRE JAUNE
	COVID-19 ⁶
12 MOIS	ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (ROR)
	PNEUMOCOCCIQUE 20 VALENT
	MÉNINGOCOCCIQUE ACWY
15 MOIS	TÉTRAVIRAL (RPR+VARICELLE) ⁷
	IPV ³
	DTC
	HÉPATITE A ⁸
4 ANS	IPV ³
	DTC ⁹
	VARICELLE (2 ^a dose) ¹⁰
	FIÈVRE JAUNE ¹¹
ANNUELLEMENT	INFLUENZA ¹²

1. Si le vaccin BCG n'a pas été administré à la maternité, l'appliquer lors de la première visite au service de santé.
2. Le vaccin contre l'hépatite B doit être administré de préférence dans les 12 premières heures de vie, encore à la maternité. Si non administré à la maternité, l'appliquer lors de la première visite au service de santé. Si la première visite a lieu après la 6^e semaine de vie, administrer le vaccin pentavalent (DTC-Hib-HB).
3. Vaccin poliomyélite inactivé.
4. La 1^{re} dose du vaccin rotavirus doit être appliquée à 2 mois. L'âge minimum pour cette dose est de 1 mois et 15 jours, l'âge maximum de 11 mois et 29 jours.
5. La 2^e dose du vaccin rotavirus doit être appliquée à 4 mois. L'âge minimum est de 3 mois et 15 jours, l'âge maximum de 23 mois et 29 jours.
6. La troisième dose du vaccin Covid-19 est appliquée selon le fabricant.
7. Le vaccin tétravalent doit être administré aux enfants ayant déjà reçu une dose de Rougeole-Parotidite-Rubéole.
8. Vaccin disponible pour les enfants jusqu'à 4 ans, 11 mois et 29 jours.
9. Le vaccin DTC (diphtérie, tétanos et coqueluche) ne peut être administré qu'aux enfants jusqu'à 6 ans, 11 mois et 29 jours. À partir de 7 ans, utiliser le vaccin diphtérie-tétanos pour adultes.
10. La 2^e dose doit être administrée avant 6 ans, 11 mois et 29 jours.
11. Le vaccin contre la fièvre jaune doit être administré en rappel aux enfants ayant reçu la première dose avant 5 ans. Respecter un intervalle minimum de 30 jours entre les doses.
12. Disponible dans le réseau public pendant les campagnes. Enfants à partir de 6 mois.

BCG – Vaccin BCG (contre la tuberculose)
 IPV – Vaccin poliomyélitique inactivé (1, 2 et 3)
 DTC – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos et coqueluche

Source : Secrétariat d'État à la Santé / CVE / Division d'Immunisation

CALENDRIER DE VACCINATION | Enfants (à partir de 7 ans) et adolescents¹



INTERVALLE ENTRE LES DOSES	VACCIN	SCHÉMA
PREMIÈRE VISITE	BCG	DOSE UNIQUE
	HÉPATITE B	PREMIÈRE DOSE
	dT - DOUBLE ADULTE ²	PREMIÈRE DOSE
	IPV	PREMIÈRE DOSE
	HPV ³	DOSE UNIQUE
	ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (ROR)	PREMIÈRE DOSE
2 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	MÉNINGOCOCCIQUE ACWY ⁴	DOSE UNIQUE
	HÉPATITE B ⁵	DEUXIÈME DOSE
	dT - DOUBLE ADULTE ²	DEUXIÈME DOSE
	IPV	DEUXIÈME DOSE
	ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (ROR)	DEUXIÈME DOSE
4-6 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	HÉPATITE B ⁶	TROISIÈME DOSE
	dT - DOUBLE ADULTE ²	TROISIÈME DOSE
	IPV	TROISIÈME DOSE
	FIÈVRE JAUNE ⁷	DOSE UNIQUE
TOUS LES 10 ANS À VIE	dT - DOUBLE ADULTE ⁸	RAPPEL

Remarque : Administrer une dose du vaccin pneumococcique 23-valent aux populations autochtones à partir de 5 ans SANS preuve de vaccination antérieure par le vaccin pneumococcique conjugué. Administrer une dose de rappel, une seule fois, en respectant un intervalle minimal de 5 ans après la dose initiale.

1. Adolescence : période entre 10 et 19 ans. Si le dossier vaccinal est incomplet, compléter le schéma commencé.
2. Si trois doses ou plus des vaccins penta (DTC+Hib+HB), tétra (DTC+Hib), DTC, DT et dT ont été reçues, administrer une dose de rappel après 10 ans de la dernière dose.
3. Le vaccin HPV doit être administré aux filles et aux garçons à 9 ans. Si non appliquée dans cette tranche d'âge, la vaccination peut être réalisée jusqu'à 14 ans, 11 mois et 29 jours.
4. Le vaccin Méningococcique ACWY est indiqué pour les 11 à 14 ans, 11 mois et 29 jours.
5. L'intervalle minimal entre la 1^{re} et la 2^e dose d'hépatite B est de 4 semaines.
6. L'intervalle pour la 3^e dose d'hépatite B peut être de 2 mois après la 2^e, à condition que l'intervalle depuis la 1^{re} dose soit au moins 4 mois.
7. Si une seule dose de vaccin contre la fièvre jaune a été reçue avant l'âge de 5 ans, une dose supplémentaire doit être administrée, quel que soit l'âge de la personne.
8. En prophylaxie du tétanos après certains types de blessures, réduire cet intervalle à 5 ans.

dT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos adulte
DT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos enfant
DTC – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos et coqueluche
IPV – Vaccin poliomyélitique inactivé (1,2 et 3)
HPV – Vaccin contre le papillomavirus humain (types 6, 11, 16 et 18) recombinant

CALENDRIER DE VACCINATION | Pour adultes entre 20 et 59 ans¹



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA
DA SAÚDE

INTERVALLE ENTRE LES DOSES	VACCIN	SCHÉMA
PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE ²	PREMIÈRE DOSE
	HÉPATITE B	PREMIÈRE DOSE
	ROUGEOLE-OREILLONS- RUBÉOLE (ROR) ³	DOSE UNIQUE
2 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE	DEUXIÈME DOSE
	HÉPATITE B ⁴	DEUXIÈME DOSE
	FIÈVRE JAUNE ⁵	DOSE UNIQUE
4-6 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE	TROISIÈME DOSE
	HÉPATITE B ⁶	TROISIÈME DOSE
TOUS LES 10 ANS À VIE	dT – DOUBLE ADULTE ⁷	RAPPEL

1. Si le dossier vaccinal est incomplet, compléter le schéma déjà commencé.
2. Si trois doses ou plus de Penta, Tétravalent, DTC, DT, DTCa, dT acellulaire (dTpa) ou dT ont été reçues, administrer une dose de rappel 10 ans après la dernière dose.
3. Pour les 20-29 ans et les professionnels de santé, deux doses de ROR sont recommandées avec un intervalle de 4 semaines. Les autres adultes jusqu'à 59 ans doivent avoir au moins une dose. Disponible aussi pour les femmes en post-partum (calendriers pour femmes enceintes et puerpérales).
4. Intervalle minimal entre 1^{re} et 2^e dose d'hépatite B : 4 semaines.
5. Si une seule dose de fièvre jaune a été reçue avant 5 ans, une dose supplémentaire est nécessaire quel que soit l'âge au moment de la vaccination.
6. Intervalle pour la 3^e dose d'hépatite B : 2 mois après la 2^e dose, à condition qu'au moins 4 mois se soient écoulés depuis la 1^{re} dose.
7. En prophylaxie du tétanos après certains types de blessures, réduire cet intervalle à 5 ans. En cas de grossesse, se référer au calendrier spécifique pour femmes enceintes.

dT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos adulte

DT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos enfant

DTC – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos et coqueluche (triple bactérien)

DTCa – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire)

dTpa – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire) adulte

Source : Secrétariat d'État à la Santé / CVE / Division d'Immunisation

CALENDRIER DE VACCINATION | Pour 60 ans et plus¹



INTERVALLE ENTRE LES DOSES	VACCIN	SCHÉMA
PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE ²	PREMIÈRE DOSE
	FIÈVRE JAUNE ³	DOSE UNIQUE ⁴
	HÉPATITE B	PREMIÈRE DOSE
	COVID-19 ⁵	
2 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE	DEUXIÈME DOSE
	HÉPATITE B ⁶	DEUXIÈME DOSE
4-6 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE	TROISIÈME DOSE
	HÉPATITE B ⁷	TROISIÈME DOSE
	COVID-19 ⁵	
TOUS LES 10 ANS À VIE	dT – DOUBLE ADULTE ⁸	RAPPEL
ANNUELLEMENT	INFLUENZA ⁹	UNE DOSE

1. Si le dossier vaccinal est incomplet, compléter le schéma commencé.
2. Si 3 doses ou plus de DTC, DT, dT ont été reçues, administrer un rappel 10 ans après la dernière dose.
3. Évaluer le rapport bénéfice-risque selon la maladie et les événements indésirables possibles dans cette tranche d'âge ou en cas de comorbidités.
4. Si une seule dose de fièvre jaune a été reçue avant 5 ans, une dose supplémentaire doit être administrée, quel que soit l'âge.
5. Administrer une dose tous les 6 mois, indépendamment des doses précédemment reçues.
6. Intervalle minimal entre 1^{re} et 2^e dose d'hépatite B : 4 semaines.
7. Intervalle pour la 3^e dose d'hépatite B : 2 mois après la 2^e dose, avec au moins 4 mois depuis la 1^{re} dose.
8. En prophylaxie du tétanos après certains types de blessures, réduire à 5 ans cet intervalle.
9. Dose annuelle, de préférence en automne, avant la plus forte circulation du virus de la grippe.

dT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos adulte

DT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos enfant

DTC – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos et coqueluche (triple bactérien)

DTCa – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire)

dTpa – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire) adulte

CALENDRIER DE VACCINATION | Pour femmes enceintes et puerpérales¹



INTERVALLE ENTRE LES DOSES	VACCIN	SCHÉMA
PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE	PREMIÈRE DOSE
	HÉPATITE B	PREMIÈRE DOSE
2 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT – DOUBLE ADULTE	DEUXIÈME DOSE
	HÉPATITE B ³	DEUXIÈME DOSE
4-6 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dTpa ⁴	TROISIÈME DOSE
	HÉPATITE B ⁵	TROISIÈME DOSE
28 ^e SEMAINE DE GROSSESSE	VRS A et B	UNE DOSE
À TOUT MOMENT DE LA GROSSESSE	COVID-19 ⁶	UNE DOSE
	INFLUENZA ⁶	UNE DOSE
PUERPÉRALITÉ	COVID-19 ⁷	UNE DOSE
	INFLUENZA ⁷	UNE DOSE
	ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (ROR) ⁸	DOSE UNIQUE ⁹

1. Si le dossier vaccinal est incomplet, compléter le schéma commencé.
2. Si trois doses ou plus de Penta, Tétravalent, DTC, DT, DTCa, dTpa OU dT ont été reçues, administrer un rappel avec le vaccin dTpa à partir de la 20^e semaine de grossesse.
3. Intervalle minimal entre 1^{re} et 2^e dose d'hépatite B : 4 semaines.
4. Le vaccin dTpa doit être administré à partir de la 20^e semaine à chaque grossesse. Les femmes avec un début tardif de schéma doivent recevoir la dTpa à la 1^{re} ou 2^e visite, complétant le schéma avec dT. Si la dTpa n'a pas été administrée pendant la grossesse, l'administrer en post-partum.
5. Intervalle pour la 3^e dose d'hépatite B : 2 mois après la 2^e dose, avec au moins 4 mois depuis la 1^{re} dose.
6. Administrer une dose à tout moment de la grossesse à chaque grossesse, indépendamment des doses antérieures.
7. Administrer si le vaccin n'a pas été appliqué pendant la grossesse.
8. Si le vaccin n'a pas été administré à la maternité, administrer à la première visite au service de santé. Prévoir la 2^e dose pour les personnes adolescentes ou adultes jusqu'à 29 ans.
9. Pour les personnes adolescentes, adultes jusqu'à 29 ans et professionnels de santé, deux doses de ROR sont recommandées avec un intervalle minimum de 4 semaines. Les autres puerpérales doivent avoir au moins une dose.

dT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos adulte

DT – Vaccin adsorbé diphtérie et tétanos enfant

DTC – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos et coqueluche (triple bactérien)

DTCa – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire)

dTpa – Vaccin adsorbé diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire) adulte

VRS – Vaccin contre le virus respiratoire syncytial A et B (recombinant)