

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 7 ANOS DE IDADE

A vacinação infantil é essencial para proteger as crianças contra doenças infecciosas graves e fortalecer seu sistema imunológico desde cedo. Seguir o calendário vacinal é um ato de responsabilidade e amor, assegurando um futuro saudável e protegido para nossas crianças.



IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG	Única	Formas graves da tuberculose (miliar e meníngea)
	Hepatite B	Única	Hepatite B
2 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	1ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	1ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 20V ¹	1ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 20 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)	1ª dose	Diarreia por rotavírus
3 meses	Meningocócica C	1ª dose	Doença meningocócica
4 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	2ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	2ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 10V	2ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)	2ª dose	Diarreia por rotavírus
5 meses	Meningocócica C	2ª dose	Doença meningocócica
6 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	3ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	3ª dose	Poliomielite
	Influenza ²	1ª dose	Infecções pelo vírus influenza
	Covid-19 ³	1ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
	SCR (Sarampo/Caxumba/Rubéola) ⁴	Dose zero	Sarampo, caxumba e rubéola
7 meses	Covid-19 ³	2ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
9 meses	Covid-19 ³	3ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
	Febre amarela	1ª dose	Febre amarela
12 meses	Pneumocócica 20V ¹	Reforço	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 20 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	Meningocócica ACWY	Reforço	Doença meningocócica
	SCR (Sarampo/Caxumba/Rubéola)	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola
15 meses	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	Reforço	Poliomielite
	DTP (Difteria/Tétano/pertussis)	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Hepatite A	Dose única	Hepatite A
	SCR e Varicela	2ª dose de SCR e 1ª dose de Varicela	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
4 anos	DTP (Difteria/Tétano/pertussis)	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Varicela	2ª dose	Varicela
	Febre Amarela ⁵	Reforço	Febre Amarela

1-Esquema de transição para a vacinação de rotina.

2-Na primovacinação são recomendadas duas doses com intervalo de 4 semanas. Está recomendada a vacinação anual para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses 29 dias de idade).

3-Crianças vacinadas com vacinas covid-19 com cepas originais (Coronavac ou Pfizer baby) deverão completar o esquema vacinal com a vacina covid-19 disponível e recomendada no momento. Crianças com comorbidade/imunocomprometidas realizar esquema diferenciado conforme recomendações especiais. Terceira dose da vacina covid-19 a depender do fabricante

4-Recomendada a vacinação com dose zero na vigência de risco aumentado para transmissão de sarampo, conforme recomendações vigentes.

5-Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses. Casos de vacinação anterior com dose fracionada deverão receber a dose padrão, conforme orientações vigentes.📄